

Orchidopexie voor torsio testis

Beste ouder,

U/Uw zoon werd opgenomen voor een orchidopexie van één of beide teelballen. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de nazorg tijdens de komende dagen. Van de verpleegkundige ontving u ook een door de dienst anesthesie opgesteld document over de pijnstilling.

Normale zorgen

Ter hoogte van de balzak werd een verbandje aangebracht; mogelijks kan dit al snel loskomen. Indien dit de eerste 5 dagen gebeurt, wordt best een nieuw verband aangebracht. Nadien is dit niet meer noodzakelijk (wondje wel regelmatig eens ontsmetten met isobetadine).

De pijn valt doorgaans goed mee (zeker met het pijnbeleid dat u werd meegegeven). De hechtingen dienen ter plaatse te blijven tot ze spontaan verdwijnen ; dit kan tot 4 weken duren (regelmatig ontsmetten met isobetadine).

Douchen is toegestaan vanaf de eerste dag na de operatie. Zwemmen en baden evenals sport en overmatig bewegen zijn de eerste 2-3 weken niet aangewezen. Een controleafspraak werd u meegegeven bij ontslag.

Mogelijke problemen

1. Wondontsteking

- Mijn kind klaagt van toenemende pijn ter hoogte van het wondje en er is roodheid rond de wonde: dit wijst mogelijk op een wondinfectie. U raadpleegt hiervoor best uw huisarts.

2. Zwelling

- De balzak is gezwollen en verkleurd (rood/paars): dit is het gevolg van een bloeditstorting. Dit komt vrij frequent voor, is onschuldig en doorgaans lost dit zichzelf snel op.

Hoewel ernstige problemen uiterst zeldzaam voorkomen, kan u met deze ongemakken g
econfronteerd worden. Uiteraard is deze lijst niet volledig en kan u bij twijfel steeds te-
recht op het secretariaat urologie. Aarzel niet om ons – bij voorkeur tijdens de diensturen –
te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. S De Prycker

Dr. B De Troyer

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. H P Wynant