

Wissel of uithalen ureterstent

Beste,

U onderging een wissel of uithalen van een stent via het dagziekenhuis. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de nazorg tijdens de komende dagen.

Normale zorgen

- De eerste dagen na de ingreep zal plassen wat pijnlijk zijn. Het is aangeraden om toch voldoende te drinken om de urine te verdunnen. Pijnstilling bestaande uit Dafalgan 1g (4 keer per dag) volstaat.
- De urine zal de eerste uren vaak rood aankleuren; dit is normaal.

Mogelijke problemen

- In de dagen na de ingreep neemt branderigheid tijdens het plassen eerder toe; tevens merkt u dat u zeer frequent moet gaan plassen voor telkens kleine hoeveelheden. Mogelijks wijst dit op een blaasontsteking; hiervoor contacteert u best uw huisarts. Na het afnemen van een urinecultuur kan dan antibiotica gestart worden.
- Indien de stent werd gewisseld zijn volgende klachten mogelijk:
 - wisselende bloederige urine vooral bij meer lichaamsbeweging,
 - pijn ter hoogte van de nieren tijdens en kort na het plassen,
 - gevoel van geprikkelde blaas (vaker en dringender moeten plassen).

Deze klachten zijn het gevolg van de stent en kunnen dus in zekere mate aanwezig zijn.

- Indien de stent definitief werd verwijderd zouden alle klachten moeten verdwenen zijn na enkele dagen. Bij het ontstaan van pijn of koorts verwittigt u het secretariaat (tel. 03 760 23 59).

Hoewel ernstige problemen uiterst zeldzaam voorkomen, kan u met deze ongemakken geconfronteerd worden. Uiteraard is deze lijst niet volledig en kan u bij twijfel steeds terecht op het secretariaat urologie. Aarzel niet om ons – bij voorkeur tijdens de diensturen – te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. S De Prycker

Dr. B De Troyer

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. H P Wynant